

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
МИНИСЕМ

Регистрационный номер: ЛС-000659-280911

Торговое название: Минисем

Химическое название: метионил–глутамил–гистидил–фенилаланил–пролил–глицил–пролин

МНН : метионил–глутамил–гистидил–фенилаланил–пролил–глицил–пролин

Лекарственная форма: капли назальные 0.01%

Состав: семакса в пересчете на 100% вещество – 0,1 мг, вода очищенная до 1мл.

Описание: Бесцветная прозрачная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа. Ноотропное средство.

Код АТХ - [N06BX]

Фармакологические свойства. Минисем капли назальные 0.01% – оригинальный синтетический пептидный препарат, являющийся аналогом фрагмента адренотропного гормона (АКТГ₄₋₁₀) (метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин), полностью лишенный гормональной активности. Все аминокислоты L-формы.

Фармакодинамика. Минисем капли назальные 0.01% влияет на процессы, связанные с формированием памяти и обучения. Минисем усиливает избирательное внимание при обучении и анализе информации, улучшает мнестические функции; улучшает адаптацию организма к гипоксии, церебральной ишемии, наркозу и другим повреждающим воздействиям. В условиях нервно-психического истощения. Минисем облегчает концентрацию внимания, улучшает операторскую деятельность и умственную работоспособность.

Фармакокинетика. Всасывание со слизистой оболочки полости носа 60-70%. Быстро распределяется во все органы и ткани, проникает через гематоэнцефалический барьер. Неизмененный препарат и/или его метаболиты не определяются в суточной моче.


Показания к применению. Минисем, как ноотропное средство, применяют для лечения интеллектуально-мнестических расстройств, при сосудистых поражениях головного мозга у детей, при задержке психомоторного развития перинатального генеза у детей раннего возраста (с 3-х месяцев и старше), при лечении невротических и когнитивных нарушений у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Минисем применяют для повышения адаптационных возможностей организма ребенка.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость препарата, острые психотические состояния, беременность, период грудного вскармливания, склонность к судорогам, дети до 3-х месяцев (в связи с отсутствием данных).


Побочные действия. При длительном применении возможно слабое раздражение слизистой оболочки носа.

Способ применения и дозы.


Минисем применяют интраназально, используя флакон-кпельницу.



Аккуратно срезать кончик пипетки в месте, указанном на рис. 1.



Колпачок должен плотно закрывать пипетку - рис. 2.



Перевернуть флакон и, легко постукивая пальцем по доньшку, дождитесь, чтобы жидкость заполнила все пространство пипетки - рис. 3.



Снимите колпачок и легким надавливанием на широкую часть пипетки, выдавите необходимое количество капель препарата в носовой ход (на слизистую оболочку) - рис. 4.

Капли в нос закапывают ребенку после очищения носовых ходов. Ребенка кладут на бок и вводят в ноздрю, которая оказывается сверху, по одной капле лекарства, осторожно массируя нос в промежутке между введением каждой капли - рис. 5.

Затем ребенка поворачивают на другой бок и повторяют процедуру.

Предупреждение: не касаться пипеткой слизистой носа.

Хранить препарат с плотно закрытым колпачком, как показано на рис. 2.

В каждой капле стандартного раствора содержится 5 мкг активного вещества. Раствор препарата закапывают пипеткой в количестве не более 3 капель (15 мкг) за одно введение в каждый носовой ход 2-3 раза в день с интервалом 3-4 часа.

Разовая доза составляет от 1 до 3 капель (5-15 мкг) дробно с интервалом 10-15 мин до достижения терапевтической дозы 18 капель (90 мкг).

Препарат, назначают ежедневно в течение 3-5 дней. Длительность курсового применения препарата составляет 14 дней. При необходимости курс лечения может быть повторен через 4 недели.

Побочное действие. При повышенной чувствительности к препарату может появиться раздражение слизистой оболочки носа, кожная сыпь, нарушение сна, повышенная возбудимость, раздражительность, повышение артериального давления, аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Нежелательно применение с интраназальными препаратами с местным сосудосуживающим действием.

Форма выпуска.

Капли назальные 0,01%. По 3 мл во флакон, укупоренный пластмассовой крышечкой-капельницей. Каждый флакон с инструкцией по применению упаковывают в пачку, изготовленную из картона упаковочного.

Условия хранения.

В защищенном от света месте при температуре не выше +10°C. Не допускать замораживания. Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности. 1 год. Не употреблять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек. По рецепту.